



Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabilitation – Eine Literaturübersicht über den aktuellen Stand der Forschung



n. Satterfield et al., 2009



Einschlusskriterien:

- ✓ deutsche und englische Sprache,
- ✓ Bezug zur stationären medizinischen Rehabilitation,
- ✓ Hinweise zur Sozialen Arbeit unabhängig von Leistungen anderer Berufsgruppen
- ✓ 2000 bis 2018

Abb.1 Flussdiagramm Ein- und Ausschluss der Literaturnachweise; *Suchterme u.a. bei Knoop, Dettmers & Meyer, 2019

T. Knoop¹, S. Dettmers² & T. Meyer¹
¹Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Stiftungsprofessur Rehabilitationswissenschaften | Rehabilitative Versorgungsforschung, Universität Bielefeld
²FB Soziale Arbeit & Gesundheit, FH Kiel


Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabilitation – Ergebnisse der Literaturübersicht



Knoop, Dettmers &
Meyer, 2019

Analyse des Versorgungsgeschehens:

Abb.2 Anteil (mindestens einmalig dokumentierte sozialarbeiterische Leistungen) nach Indikation (Publikation)



Vergleich des Erfolgs:

Tab. 1 randomisiert-kontrollierte Studien (RCT) bzw. simulierte RCTs zur Sozialen Arbeit in der med. Rehabilitation (n.s. = nicht signifikant, **kein** Effekt)

Intervention, Indikationsbereich, Nachweis	Ergebnis	
Sozialarbeiterische Telefon-Nachsorge, Orthopädie (Vogel et al. 2017) (n=333)	Sozialmedizinisches Risiko verringert (p=.01)	+
Sozialarbeiterische Telefon-Nachsorge, Orthopädie (Fröhlich et al. 2016) (n=447)	Kein Effekt bzgl. subjektiver Erwerbsprognose (p=.30)	n.s.
Sozialberatung, Orthopädie (Knoop & Meyer, subm.) (n=54.056)	Reha-Erfolg verschlechtert (p=.000, r=-0,12)	-
Begleitende Sozialberatung, Psychosomatik (Bommersbach & Becker, 2014) (n=372)	Kein Effekt bzgl. RTW-Quote (p=.68)	n.s.
Sozialarbeiterisches Case Management, Psychosomatik (Spyra et al. 2018)) (n=26)	Lebensqualität verbessert (0,1 < SRM < 0,28)	?
Sozialtherapeutische Gruppenintervention, Kardiologie (Salzwedel et al., 2019) (n=337)	Kein Effekt bzgl. gesundheitsbez. Lebensqualität (p=.58)	n.s.
	Kein Effekt bzgl. Anteil der AU Fälle (p=.18)	n.s.
Sozialberatung, Kardiologie (Knoop & Meyer, subm.) (n=16.955)	Reha-Erfolg verschlechtert (p=.000, d=-0,20)	-